



Centro di Diagnostica per Immagini "ISTITUTO SANTA CHIARA"
Via Don L. Sturzo, 2 – San Vito dei Normanni (BR) 0831.952231 –3408285341
Direttore Tecnico e Medico Responsabile: Dott. Francavilla Ivo

ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO PARAMAGNETICO

Esami preliminari per RMN con MDC (validità 20- 30 giorni)

- Azotemia
- Creatininemia
- Elettroforesi proteica

DA COMPILARE DA PARTE DEL MEDICO CURANTE O SPECIALISTA PAZIENTE

Cognome _____ Nome _____

Nato/a _____ il _____

peso (kg) _____ sesso M F

quesito clinico: _____

EVENTUALI MALATTIE NOTE: (crociare se positivo)

- Favismo
- Asma
- Diabete
- Insufficienza epatica
- Insufficienza renale
- Insufficienza cardiovascolare (III/IV classe NYHA)
- Mieloma multiplo
- Paraproteinemia di Waldestrom
- Assunzione di farmaci nefrotossici (se si specificare quale) _____
(ciclosporine, cisplatino, aminoglicosidi, betabloccanti, interleuchina 2, idramalazina)

PRECEDENTI SOMMINISTRAZIONI DI MDC: ° SI ° NO

PRECEDENTI REAZIONI ALLERGICHE A MDC: ° SI ° NO

PRECEDENTI REAZIONI ALLERGICHE A FARMACI O ALTRE SOSTANZE

°SI (specificare quali) _____ °NO

TRATTAMENTO IN ATTO CON FARMACI: °SI °NO

(Solo se uno di quelli indicati) **b-bloccanti**
//Interleukina2//Aminoglicosidi//Ciclosporina//Cisplatino (sottolineare): in caso di
risposta positiva se possibile sospendere la terapia per un tempo superiore alla emivita del
farmaco.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO CURANTE _____

**In caso di anamnesi positiva per precedenti reazioni allergiche è necessario eseguire
preparazione desensibilizzante:**

- 13 ore prima dell'esame assumere 2 cpr di DELTACORTENE da 25mg;
- 7 ore prima dell'esame assumere 2 cpr di DELTACORTENE da 25mg;
- 1 ora prima dell'esame assumere 2 cpr di DELTACORTENE
- 1 ora prima dell'esame assumere anche clorfenamina 10mg (es.Trimeton)

Nota: si consiglia, previa consulta con il medico curante, di assumere anche 1 cp di
gastroprotettore per via orale (es. Omeprazolo).

**IN CASO DI RIFERITE ALLERGIE AL MDC SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE L'ESAME PRESSO
STRUTTURE OSPEDALIERE.**



DA LEGGERE E COMPILARE DA PARTE DEL PAZIENTE

Togliere fermagli per capelli, occhiali, gioielli, orologio, carte di credito, monete, chiavi, vestiti con ganci e bottoni metallici, spille, apparecchi per udito, lenti a contatto, protesi dentarie mobili, eventuale trucco dal viso.

Per l'esecuzione dell'esame radiologico che prevede l'utilizzo del mezzo di contrasto(mdc) è necessario astenersi dall'assunzione di cibi sia solidi che liquidi (caffè succo di frutta, alcool latte...)da almeno 6 ore. È possibile bere solo acqua fino a un'ora prima dell'esame.

Il mezzo di contrasto (mdc) è un liquido, che viene somministrato prima e/o durante l'esame radiologico. Questo liquido permette di delineare con buona precisione l'organo o la struttura che si vuole esaminare, rivelando i difetti, le malattie o comunque le lesioni che interessano le strutture e gli organi esaminati.

Devono però essere assunti quei farmaci che sono abitualmente assunti ogni giorno dal paziente, e che vengono ingeriti con qualche sorso d'acqua. Dopo l'esame bere abbondantemente acqua.

- **Eventi avversi:** Dopo l'iniezione di mdc si avverte una transitoria sensazione di calore diffuso, è possibile che durante e dopo la somministrazione di mdc paramagnetico si verifichino effetti indesiderati legati a reazioni avverse che possono essere IMMEDIATE e RITARDATE. In rapporto alla loro gravità le reazioni possono essere lievi (nausea, vomito dolore nella sede dell'iniezione), moderate (difficoltà respiratorie, cadute della pressione, aumento del ritmo del cuore) o eccezionalmente a rischio per la vita (gravi aritmie, broncospasmo severo, rava difficoltà respiratoria che deve essere immediatamente risolta, arresto cardiorespiratorio, insufficienza renale acuta), reazioni ritardate (da 1 ora dall'inizio fino a 7 giorni), che consistono più frequentemente in eruzioni cutanee (dermatiti) sindromi similinfluenzali, disturbi gastrointestinali. Nel caso in cui si manifestino reazioni ritardate recarsi in PRONTO SOCCORSO. Durante l'infusione di mezzo di contrasto vi è la possibilità che , per cause anatomiche o fragilità della vena, si possa verificare la rottura del vaso con conseguente stravasamento del mdc: in questo caso la tumefazione viene trattata con pomate sintomatiche e impacchi caldo- umidi, eventualmente da proseguire a domicilio.

- **Cosa dire e cosa portare al Medico Radiologo:** è molto importante riferire i sintomi che hanno portato all'esecuzione dell'esame ed esibire eventuali esami radiologici ed ecografici eseguiti in precedenza. Nel caso che l'esame sia ripetuto a distanza di tempo è necessario riportare la documentazione radiologica precedente. Il medico radiologo deve poter consultare il risultato di eventuali altri esami strumentali o visite specialistiche e, se disponibili, la relazione del Curante o lettere di dimissioni emesse in occasione di precedenti ricoveri.

CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto sig./ra _____ ho preso visione delle informazioni relative alla procedura radiologica proposta ed ho ricevuto in proposito risposte chiare ed esaurienti ad ogni mia domanda. Mi è noto che l'esame, come molti trattamenti sanitari, non è completamente esente da rischi o da reazioni avverse, che nel mio caso specifico mi sono stati adeguatamente illustrati. Mi è stato comunicato che sono state predisposte tutte le idonee misure e precauzioni per prevenire e/o fronteggiare ogni eventuale complicità.

Pertanto dichiaro di:

- acconsentire allo svolgimento dell'indagine con somministrazione di mdc**
- acconsentire allo svolgimento dell'indagine senza somministrazione di mdc**
- non acconsentire allo svolgimento dell'indagine**

DATA _____

FIRMA DEL PAZIENTE _____